

Matrices et Probabilités

Frédéric Laroche, octobre 2012


1. Doudou, le hamster paresseux

1.1. Le problème

Doudou, le hamster paresseux, ne connaît que trois endroits dans sa cage : les copeaux où il dort, la mangeoire où il mange et la roue où il fait de l'exercice. Ses journées sont assez semblables les unes aux autres et son activité se représente aisément par une chaîne de Markov. Toutes les minutes, il peut soit changer d'activité, soit continuer celle qu'il était en train de faire. L'appellation *processus sans mémoire* n'est pas du tout exagérée pour parler de Doudou.

- Quand il dort, il a 9 chances sur 10 de ne pas se réveiller la minute suivante.
- Quand il se réveille, il y a 1 chance sur 2 qu'il aille manger et 1 chance sur 2 qu'il parte faire de l'exercice.
- Le repas ne dure qu'une minute, après il fait autre chose.
- Après avoir mangé, il y a 3 chances sur 10 qu'il parte courir dans sa roue, mais surtout 7 chances sur 10 qu'il retourne dormir.
- Courir est fatigant : il y a 8 chances sur 10 qu'il retourne dormir au bout d'une minute, sinon il continue en oubliant qu'il est déjà un peu fatigué.

1.2. Graphe des états



Les diagrammes peuvent montrer toutes les flèches, chacune représentant une probabilité de transition. Cependant, c'est plus lisible si on ne dessine pas les flèches de probabilité zéro (transition impossible) ni les boucles (*flèche d'un état vers lui-même*). Cependant elles existent et leur probabilité est sous-entendue car on sait que la somme des probabilités des flèches partant de chaque état doit être égale à 1.

1.3. Matrices

Le vecteur d'état est $X = (1, 2, 3)$ où 1=dormir, 2=manger et 3=tourner la roue. La matrice de transition de Doudou est la suivante :

$$\begin{array}{c} \nearrow \\ 1 = \text{Dormir} \\ 2 = \text{Manger} \\ 3 = \text{Roue} \end{array} \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ \begin{pmatrix} 0,9 & 0,05 & 0,05 \\ 0,7 & 0 & 0,3 \\ 0,8 & 0 & 0,2 \end{pmatrix} & = & P \end{array}$$

Par exemple Doudou dort et est dans l'état initial X avec la distribution de probabilité $\pi_0 = (1, 0, 0)$; on le retrouve

$$\text{alors dans l'état } \pi_1 = \pi_0 P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,9 & 0,05 & 0,05 \\ 0,7 & 0 & 0,3 \\ 0,8 & 0 & 0,2 \end{pmatrix} = (0,9 \quad 0,05 \quad 0,05) \text{ puis}$$

$$\pi_2 = \pi_1 P = \pi_0 P^2 = (0,9 \quad 0,05 \quad 0,05) \begin{pmatrix} 0,9 & 0,05 & 0,05 \\ 0,7 & 0 & 0,3 \\ 0,8 & 0 & 0,2 \end{pmatrix} = (0,885 \quad 0,045 \quad 0,07), \text{ etc.}$$

Très vite on arrive à $\pi_n = \pi_{n-1} P = \pi_0 P^n = (0,884 \quad 0,044 \quad 0,072)$: Doudou dort 88,4 % du temps...

Évidemment c'est la matrice P^n qui est importante : celle-ci converge si et seulement si la chaîne de Markov est **apériodique et irréductible** (tout état du graphe est accessible à partir de n'importe quel autre état du graphe, voir plus bas).

Dans ce cas on a $\pi_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi$ et donc $\pi P = \pi \Leftrightarrow \pi P = \pi I \Leftrightarrow \pi(P - I) = 0$: ici cela donne avec $\pi = (a, b, c)$ et $a + b + c = 1$ (on évite les solutions triviales...) le vecteur limite $\pi = (0,884 \quad 0,044 \quad 0,072)$.

On peut remarquer également que dans ce cas 1 est valeur propre de P .

Avec GeoGebra

* Noter que les calculs se font à l'aide d'un logiciel de calcul formel, de GeoGebra ou de la calculatrice.

Pour GeoGebra la syntaxe (ligne de saisie) est par exemple :

Instruction Geogebra	Action
$P = \{\{0.9, 0.05, 0.05\}, \{0.7, 0, 0.3\}, \{0.8, 0, 0.2\}\}$	Définition de la matrice P
$P_n = \text{Séquence}[D^n, n, 1, 5]$	Puissances de P de P à P ⁵ .
$p = \{\{1, 0, 0\}\}$	Distribution initiale sous forme de vecteur ligne. Si on veut utiliser un vecteur colonne on l'écrira $p = \{\{1\}, \{0\}, \{0\}\}$. Attention à l'écriture de la matrice suivant les cas.
$p_n = \text{Séquence}[p * \text{Elément}[D_n, k], k, 1, 5]$	Distributions successives

Pour résoudre avec le CAS (calcul formel) installer la version 4.2 (en vrai numérotée 4.1.xx, ouarff !)

Voir ici <http://code.google.com/p/geogebra/downloads/list>

Pour les commandes : http://wiki.geogebra.org/fr/Commandes_Calcul_formel

Résolution :

Instructions du CAS	Action
$X := \{a, b, c\}$	Vecteur solution inconnu
$U := X * (D - I)$	Création des équations sous forme matricielle
$L_1 := \text{Elément}[U, 1, 1]$	Récupération des éléments de U
$L_2 := \text{Elément}[U, 1, 2]$	
$L_3 := \text{Elément}[U, 1, 3]$	
$L := \{L_1 = 0, L_2 = 0, L_3 = 0, a + b + c = 1\}$	Création de la liste des équations (on rajoute la contrainte de probabilité)
$S = \text{Solutions}[L, X]$	Recherche des solutions

2. Quelques éléments théoriques

Soit M un ensemble de résultats d'une épreuve, appelé *espace d'états* (souvent \mathbb{N} sinon l'espace M est un sous espace de \mathbb{R}^n muni d'une structure adéquate) et $X_n \in M$ une variable désignant l'état à l'instant $n \in \mathbb{N}$ d'un


système soumis à une loi d'évolution aléatoire (par exemple $X_n = (1, 2, \dots, m)$ correspondant aux m états possibles).

Dans de nombreuses situations l'évolution temporelle de X_n vérifie la propriété suivante : « la loi de X_{n+1} ne dépend de l'histoire X_0, X_1, \dots, X_n du système que par l'état présent X_n ». Pour résumer : le résultat d'une épreuve ne dépend que du résultat de l'épreuve précédente.

Cette propriété s'appelle la *propriété de Markov* et la suite (X_n) une *chaîne de Markov*¹.

Ces chaînes de Markov apparaissent dans des domaines aussi divers que la physique, la biologie, l'économie, l'informatique, et sont un objet essentiel de l'étude des processus évolutifs.

Comme ce qui compte est finalement la connaissance des graphes des états



ou des probabilités conditionnelles (les nombres i, j sont des éléments des vecteurs X)

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i_n) = p_{ij},$$

on peut créer une matrice (dite de transition ou de passage) listant toutes ces probabilités :

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & \cdots & p_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{m1} & \cdots & p_{mm} \end{pmatrix}$$

de sorte que $X_n P = X_{n+1}$.

Quelques règles et définitions :

- Un état i est *absorbant* lorsque $p_{ii} = 1$; l'ensemble des états absorbants est le *bord* de l'ensemble des états : lorsque tout chemin conduit à un état absorbant, on dit que la chaîne est *absorbante*.
- La probabilité de réaliser un parcours fixé est le produit des probabilités des transitions situées sur le parcours.
- La probabilité de transition $p_{ij}^{(n)}$ de passer en n étapes de l'état i à l'état j est le terme ij de la matrice P^n .
- La probabilité de commencer le processus à l'état i est notée $\pi_i^{(0)}$; la distribution de probabilité initiale est $\pi_0 = (\pi_1^{(0)}, \dots, \pi_m^{(0)})$; à la n -ième transition la distribution de probabilité devient $\pi_n = (\pi_1^{(n)}, \dots, \pi_m^{(n)})$. On a alors $\pi_n = \pi_0 P^n$.
- Une distribution de probabilité est *constante* ou *stationnaire* si on a k tel que $\pi_k = \pi_k P$. Si la distribution π_k n'est pas stationnaire mais converge vers une distribution limite π_∞ , alors on a $\pi_\infty = \pi_\infty P$.
- S'il existe un entier n pour lequel tous les termes p_{ij} sont strictement positifs, alors P est dite *régulière*.

La matrice P peut être fixe ou évolutive (les p_{ij} changent au cours du temps), le temps lui même peut être discret (états dénombrables) ou continu : voir Renyi pour une introduction simple, Frugier pour des exercices divers et assez didactiques, Lefebvre ou Foata & Fuchs pour un cours et des exercices intéressants, Benaïm & El Karoui pour plus élaboré.

3. Le collectionneur

Dans chaque paquet de café BlackSabbath on trouve une figurine de collection.

La série complète comprend 4 figurines : on note T le nombre de paquets qu'il faut acheter pour obtenir la collection complète.


1. Représenter le processus par une chaîne de Markov.
2. Établir la matrice de transition. Calculer le vecteur de distribution de probabilité à la troisième transition.

¹ Andreï A. Markov, 1856-1922, travailla en analyse puis en probabilités. Élève de Tchebychev il généralisa la loi des grands nombres et le théorème central-limite.

3. Calculer $\mathbb{E}(T)$ et $\text{var}(T)$.

Solution :

1. Le graphe est constitué du nombre de figurines différentes obtenues : 1, 2, 3, 4.



2. La matrice P est alors :
$$P = \begin{pmatrix} 0,25 & 0,75 & 0 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0 & 0,75 & 0,25 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$
 La distribution initiale est

$\pi_0 = (1, 0, 0, 0)$ (on a une figurine grâce à l'achat d'un paquet).

Au bout de 3 achats la matrice vaut
$$P^{(3)} = \begin{pmatrix} 0,0156 & 0,3281 & 0,5625 & 0,0938 \\ 0 & 0,125 & 0,5938 & 0,2813 \\ 0 & 0 & 0,4219 & 0,5781 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
 et $\pi_3 \approx (0,016; 0,33; 0,56; 0,09)$

(probabilité d'avoir 1 figurine = 0,016, 2 figurines = 0,33, etc.).

3. Notons X_i le nombre de paquets à acheter pour passer de l'état i à l'état $i+1$:

pour $X_1 = k$, il faudra rater $k-1$ fois et réussir au k -ième achat : $\mathbb{P}(X_1 = k) = \left(1 - \frac{3}{4}\right)^{k-1} \frac{3}{4}$,

pour $X_2 = k$: $\mathbb{P}(X_2 = k) = \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{k-1} \frac{1}{2}$, pour $X_3 = k$, $\mathbb{P}(X_3 = k) = \left(1 - \frac{1}{4}\right)^{k-1} \left(\frac{1}{4}\right)$.

L'espérance de X_1 est $\mathbb{E}(X_1) = \sum_{k=1}^{\infty} k \mathbb{P}(X_1 = k) = \frac{1}{3/4} = \frac{4}{3}$, de X_2 est $\frac{1}{1/2} = 2$ et de X_3 est $\frac{1}{1/4} = 4$ (espérance

d'une loi géométrique : $\sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)^{k-1} p = -p \left(\frac{-1}{(1-(1-p))^2} \right) = \frac{1}{p}$).

Les variables X_1 , X_2 et X_3 sont indépendantes, on a alors $\mathbb{E}(T) = \mathbb{E}(X_1) + \mathbb{E}(X_2) + \mathbb{E}(X_3) = \frac{22}{3}$. La variance d'une

loi géométrique est $\frac{1-p}{p^2}$; l'indépendance donne $\text{var}(T) = \text{var}(X_1) + \text{var}(X_2) + \text{var}(X_3) = \frac{130}{9}$.

4. Transmettre

Un message codé de façon binaire est transmis à travers un réseau. Chaque bit est transmis avec une probabilité d'erreur égale à a pour un passage de 0 à 1, égale à b pour un passage de 1 à 0 (a et b différents de 0 et 1).

Le résultat de la transmission au n^{e} relais est X_n à valeurs dans $\{0, 1\}$; on suppose que les relais se comportent indépendamment les uns des autres et que les erreurs sur les bits sont indépendantes. On souhaite calculer la taille du réseau (la valeur de n) au delà de laquelle la probabilité de recevoir une erreur est supérieure à ε .

On note L la longueur du message.

1. $L = 1$: la matrice de transition est
$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}.$$

La probabilité $p_n = \mathbb{P}(X_n = 0)$ d'avoir un 0 au n^{e} relais suit la relation $p_{n+1} = (1-a)p_n + b(1-p_n)$; le point fixe est $p = \frac{b}{a+b}$, soit $p_{n+1} - p = (1-a-b)(p_n - p) \Rightarrow p_n - p = (1-a-b)^n (p_0 - p)$.

Si on envoie un 0 la probabilité que le message ne soit pas erroné au n^{e} relais est $r_n(0) = \frac{b}{a+b} + \frac{a}{a+b}(1-a-b)^n$

et si on envoie un 1 : $r_n(1) = \frac{a}{a+b} + \frac{b}{a+b}(1-a-b)^n$.

2. Si on a $L > 1$, on a $X_n = (X_1^L, X_2^L, \dots, X_n^L)$ où les variables sont indépendantes de même loi. La probabilité que le message ne soit pas erroné est alors $r_n = \prod_{i=1}^L r_n(X_0^i) \geq [\alpha + (1-\alpha)(1-a-b)^n]^L$ où $\alpha = \inf \left\{ \frac{a}{a+b}, \frac{b}{a+b} \right\}$.

La taille du réseau doit être inférieure à $n_0 = \frac{\ln(1-\alpha) - \ln((1-\varepsilon)^L - \alpha)}{-\ln(1-a-b)}$.

5. Exercices

Exercice 1

Aux mois de décembre, janvier et février, le temps à Brest est à peu près le suivant : s'il pleut un jour alors il repleut le jour suivant avec la probabilité 2/3, il fait beau avec la probabilité 1/3 ; s'il fait beau, alors il refait beau avec la probabilité 3/4 et il pleut avec la probabilité 1/4.

1. Quelle est la proportion de beaux jours en hiver ?

2. Aujourd'hui il fait beau (resp. il pleut) ; combien de temps en moyenne attendrons nous un autre jour de beau temps ? (resp. mauvais temps)

Solution : 1. Les états sont par exemple 1=beau, 2=pluie, la matrice P vaut : $P = \begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$; on cherche π :

$$\begin{cases} \pi = (a, b) \\ \pi P = \pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{3}{4}a + \frac{1}{3}b = a \\ \frac{1}{4}a + \frac{2}{3}b = b \\ a + b = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{4}{7} \\ b = \frac{3}{7} \end{cases} ; \text{ le temps de retour du beau temps est } 7/4, \text{ soit environ } 1,75 \text{ jours, de la}$$

pluie 7/3, soit environ 2,3 jours (finalement il ne pleut pas si souvent à Brest...).

2. On reprend la démarche du collectionneur : soit X_1 le nombre de jours pour repasser de l'état 1 à l'état 1 :

$$\mathbb{P}(X_1 = k) = \left(1 - \frac{4}{7}\right)^{k-1} \frac{4}{7} = b^{k-1}a \text{ et } \mathbb{E}(X_1) = \sum_{k=1}^{\infty} k \mathbb{P}(X_1 = k) = \frac{1}{4/7} = \frac{7}{4}.$$

Exercice 2

Un individu vit dans un milieu où il est susceptible d'attraper une maladie par piqûre d'insecte. Il peut être dans l'un des trois états suivants : immunisé (I), malade (M), non malade et non immunisé (S). D'un mois à l'autre, son état peut changer selon les règles suivantes :

- étant immunisé, il peut le rester avec une probabilité 0,9 ou passer à l'état S avec une probabilité 0,1 ;
- étant dans l'état S, il peut le rester avec une probabilité 0,5 ou passer à l'état M avec une probabilité 0,5 ;
- étant malade, il peut le rester avec une probabilité 0,2 ou passer à l'état I avec une probabilité 0,8.

1. Tracez un graphe probabiliste pour décrire cette situation et écrivez la matrice de transition.

2. Calculez l'état de probabilité de l'individu au bout de trois mois, de six mois, d'un an, de deux ans, pour chacune des situations suivantes :

- au départ, il est immunisé (I) ;
- au départ, il est non malade et non immunisé (S) ;
- au départ, il est malade (M).

Pouvez-vous donner des éléments sur la proportion d'individus malades dans la population étudiée ?

Exercice 3 : Nombre de piles consécutifs dans un jeu de pile ou face

Soit U_n une suite de variables aléatoires valant 1 avec probabilité p et 0 avec probabilité $1 - p$, p étant un nombre réel de l'intervalle $[0 ; 1]$.

Appelons N_n le nombre de 1 consécutifs avant le n -ième tirage. Par convention $N_0 = 0$ et $N_m = 0$ si le m -ième tirage est 0. Il est, alors, facile de vérifier que pour $n \geq 0$, $N_{n+1} = (N_n + 1) \mathbf{1}_{\{U_{n+1}=1\}}$.

1. Déterminer la matrice de transition de N_n .
2. Combien de piles consécutifs voit-on dans 100 tirages ?

Solution :

$$1. \begin{cases} p_{i,i+1} = p \\ p_{i,0} = 1 \\ p_{i,j} = 0 \text{ sinon} \end{cases}.$$

2. Définissons T_L , pour un entier L fixé, par : $T_L = \inf \{n \geq 0, N_n = L\}$, soit le plus petit entier pour lequel la suite de piles a pour longueur L : T_L est ainsi le premier instant où l'on voit une suite de L piles consécutifs.

Introduisons N_n^L (le processus arrêté à l'instant T_L) par : $N_n^L = N_{n \wedge T_L}$; notons que l'événement $\{N_n^L = L\}$ correspond à : « J'ai vu *au moins* L 1 consécutifs dans les n premiers tirages ».

D'autre part $(N_n^L, n \geq 0)$ reste une chaîne de Markov issue de 0 puisque :

$$N_{n+1}^L = (N_n^L + 1) \times \mathbf{1}_{\{U_{n+1}=1, N_n^L < L\}} + L \times \mathbf{1}_{\{N_n^L = L\}}.$$


Soit $P = (p_{i,j}), i, j \in \{0, 1, \dots, L\}$ sa matrice de transition, alors :
$$\begin{cases} p_{i,i+1} = p \\ p_{i,0} = 1-p \\ p_{L,L} = 1 \\ p_{i,j} = 0 \text{ sinon} \end{cases}, \text{ et}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1-p & p & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1-p & 0 & p & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1-p & 0 & 0 & \dots & p & 0 \\ 1-p & 0 & 0 & \dots & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour évaluer cette probabilité il reste à expliciter P et à calculer sa puissance pour diverses valeurs de L (mieux vaut alors utiliser un logiciel...). Par exemple pour une séquence de 100 tirages aléatoires on calcule P^{100} et on récupère le terme $p = \mathbb{P}(N_n^L = L) = P_{0,L}^{100}$ qui donne la probabilité d'avoir une séquence de longueur **au plus** L (attention dans les programmes lignes et colonnes de matrices sont numérotées à partir de 1 ce qui oblige à quelques contorsions...).

Programme Scilab :

```
function [Pro]= proba(L,p)
P=[p*diag(ones(L,1));zeros(1,L-1),1];
P=[(1-p)*ones(L,1);0],P];
P100=P^100;
Pro = P100(1,L+1)
```

 On peut alors obtenir sans difficultés la fonction de répartition ou la loi du nombre maximal de 1 consécutifs dans une séquence aléatoire de 100 0 ou 1 indépendants avec $p = 1/2$. Pour la loi, après avoir tapé :

```
for L=2:10;
write(%io(2),string(L)+' '+string(proba(L,1/2)-
proba(L+1,1/2)));
end;
```

On soustrait les deux résultats pour avoir la probabilité des


séquences de longueur L .

Programme Maple (plus long mais plus lisible) :


```
> restart; with(linalg):
> matrice_Markov:=proc(N,p)
  #crée une matrice (N+1)x(N+1) correspondant au modèle
  local L,M,M1,i,j;
  M1:=NULL;
  for j from 0 to N do
    if j=N then
      L:=0;
      for i from 1 to N-1 do L:=L,0; end do;
      L:=L,1;
    else
      L:=1-p;
      for i from 1 to j do L:=L,0; end do;
      L:=L,p;
      for i from j+2 to N do L:=L,0; end do;
    end if;
    M1:=M1,[L];
  end do;
  M:=convert([M1], Matrix);
end:

> proba:=proc(L,p)
  #renvoie la probabilité d'avoir L 1 consécutifs dans un tirage
  de 100 Pile/Face
  local P, Q;
  P:=matrice_Markov(L,0.5):
  Q:=P^100:
  Q[1,L+1];
end:

> L:=NULL:p:=0:
for k from 1 to 30 do
  p:=p+proba(k,0.5)-proba(k+1,0.5);
  #si on veut simplement l'histogramme: p:=proba(k,0.5)-
  proba(k+1,0.5);
  L:=L,[k,p]:
end do:
plot([L]);
```



Histogramme des probabilités



Fonction de répartition

On est donc « à peu près » sûr (à près de 80 %) de voir au moins 5 piles consécutifs dans une séquence de 100 tirages à pile ou face, pour une pièce équilibrée. Le fait de ne pas voir cinq 1 consécutifs doit être considéré comme anormal et peut servir de test pour savoir si une suite à vraiment été tirée au hasard. Il est en effet très rare qu'une personne tentant d'imiter une suite au hasard ait l'idée de mettre cinq 1 à la suite : ça marche plutôt bien (essayer avec l'un de vos camarades qui ne suit pas le cours bien sûr !).

Exercice 4 : Un modèle à support continu et temps discret, Cox-Ross-Rubinstein

Soit $(V_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes telles que $\mathbb{P}(V_n = u) = p$ et $\mathbb{P}(V_n = d) = 1 - p$ (u et d sont des coefficients multiplicateurs : u (*up*) ≥ 1 , d (*down*) ≤ 1).

Posons $X_0 = x$ et définissons par récurrence X_n par : $X_{n+1} = X_n V_{n+1}$: à tout instant le prix d'un bien monte ou descend.

La matrice de transition P est donnée par :
$$\begin{cases} p_{x, xu} = p \\ p_{x, xd} = 1 - p & x \in \mathbb{R} \\ p_{x, y} = 0 \text{ sinon} \end{cases}$$

C'est le modèle discret le plus couramment utilisé en finance. Il porte le nom de *modèle de Cox-Ross-Rubinstein*.

Voir modèle CRR : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_binomial

ainsi que <http://perso.univ-rennes1.fr/Mihai.Gradinaru/AGREG/TEXTES/europeen.pdf>

Exercice 5 : Jeunes et vieux

D'après André Deledicq, *Mathématiques buissonnières*, CEDIC 1975.

On distingue arbitrairement dans une population deux classes d'individus : les jeunes et les vieux.

Ceci permet de représenter un « état » de la population par un point du plan repéré à partir de ses coordonnées qui sont $(J; V)$ où J est le nombre de jeunes et V le nombre de vieux.

On décide d'observer l'état de la population à intervalles réguliers : cette période entre deux observations est choisie égale à la moitié de la durée de vie moyenne. Ainsi, lors d'une deuxième observation, tous les jeunes de la première observation sont devenus vieux avec un taux c ou sont morts (avec un taux de mortalité de $1 - c$) et tous les vieux sont morts ; mais chaque classe a « produit » une certaine quantité de jeunes avec les taux de natalité a (pour les jeunes) et b (pour les vieux).

A. On peut représenter la situation par un graphe (pas forcément probabiliste).

B. On définit les suites (J_n) et (V_n) où J_n est le nombre de jeunes lors du n -ième recensement et V_n est le nombre de vieux lors de ce n -ième recensement. On a alors

$$\begin{cases} J_{n+1} = aJ_n + bV_n \\ V_{n+1} = cJ_n \end{cases} \Leftrightarrow X_{n+1} = MX_n = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} X_n \text{ ou bien } \begin{cases} J_{n+2} = aJ_{n+1} + bcJ_n \\ V_{n+1} = cJ_n \end{cases}.$$

C. Prévisions démographiques.

En choisissant plusieurs conditions initiales, faire une prévision démographique et la représentation des trajectoires dans les cas suivants :

$a=0,1 ; b=0,8 ; c=0,9$	$a=0,1 ; b=1 ; c=0,9$	$a=1 ; b=1 ; c=0,9$	$a=0,5 ; b=1 ; c=0,6$
-------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Remarque

Une réflexion sur l'intervalle de définition des paramètres a , b et c s'impose. En particulier, ne peuvent devenir vieux que des jeunes de la génération précédente donc le nombre c est compris entre 0 et 1. Par contre jeunes et vieux peuvent être prolifiques donc les nombres a et b sont positifs ou nuls (si pas prolifiques du tout).

D. Des conjectures et quelques résultats.

Cette phase de conjecture peut être menée de diverses façons mais l'aide de logiciels est bienvenue ; Excel ou GeoGebra apportent des éléments de réponse. L'avantage de GeoGebra est de permettre le tracé des trajectoires.

1. Comment gérer

Dans le premier cas, on constate que l'espèce semble condamnée à l'extinction, dans le second cas l'espèce semble se stabiliser enfin dans le troisième et le quatrième cas les nombres de jeunes et de vieux semblent croître indéfiniment.

Essayons de prévoir ce que peut être la population après un très grand nombre de périodes, plus précisément que peut-il se passer si $n \rightarrow +\infty$. L'un des cas semble évoquer la convergence des suites (J_n) et (V_n) .

Supposons que ces suites convergent respectivement vers les nombres J et V . On a alors, par définition de ces suites :

$$\begin{cases} J = aJ + bV \\ V = cJ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (1-a)J = bV = bcJ \\ V = cJ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1-a-bc)J = 0 \\ V = cJ \end{cases} \text{ si } a \neq 1 \text{ et } b \neq 0.$$

Si $1-a-bc=0$ il y a une infinité de possibilités déterminées par $V=cJ$, sinon on a la seule solution $(J, V) = (0, 0)$, soit extinction des populations.

* Si $a=1$, divers cas sont à étudier :

$a=1$, $b=0$ et $c=0$ alors $V=0$ et les suites (J_n) et (V_n) sont constantes valant J_1 et V_1 .

$a=1$, $b=0$ et $c \neq 0$ alors les suites (J_n) et (V_n) sont constantes valant J_1 et V_1 .

$a=1$, $b \neq 0$ et $c \neq 0$ alors on montre que les suites (J_n) et (V_n) sont croissantes et positives. Si elles étaient majorées, elles seraient convergentes mais le système initial (S_1) montre qu'alors on aurait $J=0$ et $V=0$. Elles ne peuvent donc être majorées et leur limite est infinie.

* Si $a \neq 1$: comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = J$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = V$, le système pourrait être la conséquence d'égalités du type

$$\begin{cases} J_{n+1} = tJ_n \\ V_{n+1} = tV_n \end{cases} \text{ avec } t = \frac{bc}{1-a}.$$

Dans ce cas, à l'infini, les suites sont géométriques et la comparaison de t à 1 fournit un sérieux argument quant à l'évolution des suites. On peut vérifier ceci sur les exemples précédents.

On a alors $\begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, soit $\begin{pmatrix} a-t & b \\ c & -t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

La condition d'existence de solutions $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ non toutes deux nulles du système qui s'en déduit est : $t^2 - at - bc = 0$.

2. Étude d'un cas : $a = 0.1$; $b = 0.8$; $c = 0.9$

$t^2 - 0.1t - 0.72 = 0$ a deux racines $t_1 = -0.8$ et $t_2 = 0.9$. Recherchons des exemples de conditions initiales dans chacun de ces cas.

Si $t_1 = -0.8$ le système $\begin{cases} 0.9x + 0.8y = 0 \\ 0.9x + 0.8y = 0 \end{cases}$ a une infinité de solutions du type $\begin{pmatrix} x \\ -\frac{0.9}{0.8}x \end{pmatrix}$; soit E_1 la solution $\begin{pmatrix} -0.8 \\ 0.9 \end{pmatrix}$

qui n'a aucun intérêt pratique mais $ME_1 = -0.8E_1$ et par récurrence $M^{n-1}E_1 = (-0.8)^{n-1}E_1$.

Si $t_2 = 0.9$ le système $\begin{cases} -0.8x + 0.8y = 0 \\ 0.9x - 0.9y = 0 \end{cases}$ a une infinité de solutions $\begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix}$; soit E_2 la solution $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. De même, pour tout n , $M^{n-1}E_2 = (-0.8)^{n-1}E_2$.

On exprime les conditions initiales $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ en fonction de E_1 et E_2 en revenant aux vecteurs :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = xU + yV \text{ où } U = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } V = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ soit : } \begin{cases} E_1 = 0.8U - 0.9V \\ E_2 = U + V \end{cases}.$$

3. Questions pour les élèves

a. Exprimer U et V en fonction de E_1 et E_2 .

b. On pose $\begin{pmatrix} 0.8 & 1 \\ -0.9 & 1 \end{pmatrix}$ la matrice des coordonnées de E_1 et E_2 . Montrer que cette matrice est inversible et donner P^{-1} .

Vérifier que $M = P \begin{pmatrix} -0.8 & 0 \\ 0 & 0.9 \end{pmatrix} P^{-1}$.

c. En déduire le calcul pour tout n supérieur à 1 de M^{n-1} .

Quelles conséquences peut-on en tirer pour les suites (J_n) et (V_n) ? Qu'en déduire pour l'évolution de la population ?

d. Dans chacun des cas du C. étudier les comportements de la population considérée.

e. Voir (et travailler) à titre d'exemple plus compliqué la situation décrite ici :

http://interstices.info/jcms/i_56766/modeliser-la-propagation-dune-epidemie

Exercice 6. La ruine d'un joueur



Deux joueurs jouent à pile ou face : chaque fois que X gagne, il touche 1 de Y et réciproquement.

Ils partent respectivement d'un capital X_0 et Y_0 , et le jeu s'arrête lorsqu'un joueur n'a plus d'argent pour payer.

La fortune d'un joueur peut prendre les valeurs $\{0, 1, 2, \dots, X_0 + Y_0\}$. Si le joueur X possède une fortune $X_n = k$ à la date n , à la date $n + 1$:

- sa fortune devient $k - 1$ avec probabilité p et $k + 1$ avec probabilité $1 - p$,
- sa fortune reste en 0 avec probabilité 1 si $k = 0$,
- sa fortune reste en $X_0 + Y_0$ avec probabilité 1 si $k = X_0 + Y_0$.

Exercice 7. Le modèle stepping stone


On considère un tableau de taille $n \times n$ où chaque cellule a une couleur choisie parmi k couleurs.

À chaque instant on choisit une cellule au hasard, qui prend la couleur d'un de ses voisins immédiat lui-même choisi au hasard. Les figures suivantes montrent l'évolution de ce système pour $k = 8$ couleurs et $n = 40$.


On peut montrer qu'il s'agit d'une chaîne de Markov absorbante au sens où des régions absorbantes vont se former ; ce type de modèle apparaît naturellement en génétique.



itérations = 0



itérations = 20 000



itérations = 60 000

The stepping stone model of population structure and The decrease of genetic correlation with distance 1, M. Kimura & G. H. Weiss, 1964 : <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1210594/pdf/561.pdf>

The stepping stone model: New formulas expose old myths, J. Theodore Cox and Richard Durrett, 2002 :

<http://www.math.duke.edu/~rtd/SS/AAP091.pdf>

http://projecteuclid.org/DPubS/Repository/1.0/Disseminate?view=body&id=pdfview_1&handle=euclid.aoap/1107271664

6. Deux théorèmes

- Une matrice P est dite **irréductible** si pour tout couple (i, j) , il existe un m tel que $p_{ij}^{(m)} > 0$ (on peut atteindre l'état j à partir de i mais pas forcément avec le même nombre de sauts pour chaque i).

- Le temps de retour de l'état i à l'état i est $d = \sup \{n / p_{ii}(n) > 0\}$ (c'est le pgcd de tous les temps de retour à l'état i) : d est appelé la période de l'état i ; si $d = 1$ pour tous les états i , P est dite **apériodique**.

Théorème 1 de solidarité : tous les états ont la même période si P est irréductible.

Théorème 2 : une matrice P est régulière si elle est irréductible et apériodique.

Théorème 3 : soit P une matrice régulière. Alors :

a. $\lim_{n \rightarrow +\infty} P^n = P_\infty$ existe et est stochastique avec toutes ses lignes identiques : $P_\infty = \begin{pmatrix} p_1 & \cdots & p_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_1 & \cdots & p_n \end{pmatrix}$;

b. le vecteur $\pi = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ est une distribution d'états à éléments strictement positifs ; c'est l'unique distribution telle que $\pi I = \pi P$;

c. le temps moyen de retour à l'état i est $m_i = \frac{1}{p_i}$.

Démonstrations

a. Soit P bistochastique $N \times N$, $N \geq 3$, à valeurs strictement positives. Soient $p_{ij}^{(n)}$ (p_{ij} pour $n=1$) les éléments de P^n et d le **plus petit** élément de P , on a évidemment $0 < d < \frac{1}{2} \Rightarrow 0 < 1 - 2d < 1$.

Choisissons une colonne j de P^n et appelons m_n et M_n ses éléments minimaux et maximaux : nous montrons que $M_{n+1} \leq M_n$, $m_{n+1} \geq m_n$ et $M_n - m_n \rightarrow 0$ ce qui montrera que $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_{ij}^{(n)} = p_j$ et que cette limite ne dépend pas de i .

$M_n = \max_i \{p_{ij}^{(n)}\}$ et $m_n = \min_i \{p_{ij}^{(n)}\} = p_{aj}^{(n)}$: on a

$$\begin{aligned} M_{n+1} &= \max_i \sum_k p_{ik} p_{kj}^{(n)} = \max_i \left[\sum_{k \neq a} p_{ik} p_{kj}^{(n)} + p_{ia} m_n \right] \leq \max_i \left[M_n \sum_{k \neq a} p_{ik} + p_{ia} m_n \right] \\ &= M_n + \max_i (m_n - M_n) p_{ia} = M_n - (M_n - m_n) \min_i p_{ia} \leq M_n - d (M_n - m_n) \leq M_n. \end{aligned}$$

De même on montre que $m_{n+1} \geq m_n + d (M_n - m_n) \geq m_n$; par soustraction on obtient alors que $M_{n+1} - m_{n+1} \leq (1 - 2d)(M_n - m_n) \Rightarrow M_n - m_n \leq (1 - 2d)^{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, ok, tous les éléments de la colonne j sont identiques.

b. $X = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ est une distribution car limite de la suite de distributions X_n ; elle est unique car s'il en existait une autre Y , on aurait $Y - X = P(Y - X) \Rightarrow 0 = (Id - P^n)(Y - X) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 = (Id - P_\infty)(Y - X)$.

Pour le signe, on a simplement $p_i = \sum_j p_j p_{ji} \geq d > 0$ donc tous les éléments de X sont > 0 . Supposons que P^n (et pas forcément P) ait tous ses éléments strictement positifs, d'après le a., on a $M_{nr} - m_{nr} \rightarrow 0$; la suite $M_n - m_n$ étant monotone décroissante et extraite d'une suite convergeant vers 0 converge également vers 0

c. Soit m_{ij} le nombre moyen de sauts pour aller de i à j , on a $m_{ij} = 1 + \sum_{k \neq j} p_{ik} m_{kj}$; prenons les matrices $N \times N$:

$$M = (m_{ij}), \quad D = \begin{pmatrix} m_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & m_{NN} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad E = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

On a l'égalité matricielle : $M = E + P(M - D) = E + PM - PD$ que nous multiplions par X :



$$XM = XE + XPM - XPD = XE + XM - XD \Rightarrow XE = XD, \text{ soit}$$

$$\left(\sum_i p_i, \dots, \sum_i p_i \right) = (1, 1, \dots, 1) = (p_1 m_{11}, p_2 m_{22}, \dots, p_N m_{NN}) \text{ et } m_i = \frac{1}{p_i} \text{ pour tout } i.$$

7. Les urnes d'Ehrenfest

Au début du 20^e siècle il y a eu de nombreuses discussions à propos d'une possible contradiction entre la mécanique newtonienne et la thermodynamique (cf. par exemple le *démon de Maxwell*).

Un récipient creux est divisé en deux chambres A (ou 0) et B (ou 1) par une paroi percée d'un trou. Soient $2n$ molécules se trouvant primitivement en A, les lois de la thermodynamique prédisent que le système évoluera *irréversiblement* vers un état d'équilibre dans lequel chaque chambre contiendra finalement à peu près n molécules, ce qui est vérifié par l'expérience.



Mais toutes les lois de la mécanique sont réversibles par rapport au temps, i.e. invariantes par la transformation $t \rightarrow -t$: dans cette transformation le système s'inverse et toutes les molécules reviennent en A, ce qui constitue une évolution possible (bien que gênante) du système.


On peut même en dire davantage : H. Poincaré a démontré qu'un système dynamiquement fermé peut revenir aussi souvent qu'on veut à l'un de ses états passés (*réversibilité de Poincaré*). Paul et Tatiana Ehrenfest (1907) tentèrent d'éclaircir, à l'aide d'un modèle simple composé d'urnes, cette apparente contradiction entre réversibilité et irréversibilité.

Nous commencerons par un modèle avec trois et quatre molécules, que nous généraliserons ensuite. Pendant un court temps h , chaque particule a la même probabilité de passer dans l'autre chambre par le trou. On simule ce processus avec des urnes.

Partie I

On considère trois boules 1, 2, 3, initialement dans l'urne A (0). Tous les h , l'un des nombres 1, 2, 3 est tiré au hasard et la boule correspondante est changée d'urne. On peut décrire l'état du système de manière microscopique ou macroscopique.

Description microscopique : on donne la position exacte de chaque boule.



L'état du système est représenté par un mot de trois bits pris dans $\{0, 1\}$; les 8 états possibles peuvent être représentés comme sommets d'une boîte.


Initialement les trois boules sont en 0, soit dans le coin 000 de la boîte puis le système évolue vers l'un des trois sommets voisins ; à chaque h , un des trois chiffres sera choisi et inversé : nous avons fabriqué une promenade symétrique sur un cube. On peut facilement écrire la matrice P de transition, à 8 lignes et 8 colonnes.

Comme P est bistochastique (somme des termes de chaque ligne et de chaque colonne égale à 1), on obtient la répartition stationnaire $X = \left(\frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{8}\right)$ (voir théorème 1).

Cela signifie qu'après un temps très long tous les sommets auront reçu le même nombre de visites et que l'intervalle moyen entre deux visites à un même sommet est 8, d'où l'irréversibilité parfaite.

Description macroscopique : l'état du système est le nombre de boules situées en B.

Les boules ne sont plus discernables ; les sommets de la boîte ayant même somme de leurs trois chiffres sont regroupés, on utilise la promenade aléatoire suivante :




La chaîne de Markov est irréductible et a pour période 2. Soit $X = (p_0, p_1, p_2, p_3)$ la distribution stationnaire : pour des raisons de symétrie, on a $p_0 = p_3$ et $p_1 = p_2$; avec $p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1$ on tire $X = \left(\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{1}{8}\right)$.

Le vecteur de l'intervalle moyen entre deux visites est : $m = (m_{00}, m_{11}, m_{22}, m_{33}) = \left(8, \frac{8}{3}, \frac{8}{3}, 8\right)$ (théorème 3.c.).

Avec 4 boules on obtient la promenade suivante, ce qui donne $X = \left(\frac{1}{16}, \frac{4}{16}, \frac{6}{16}, \frac{4}{16}, \frac{1}{16}\right)$ et les temps moyens :

$$m = (m_{00}, m_{11}, m_{22}, m_{33}, m_{44}) = \left(16, 4, \frac{8}{3}, 4, 16\right).$$



Partie 2

Pour $2n$ molécules la description globale amène à une promenade semblable : la condition de réversibilité est que le flux de i à $i+1$ soit identique au flux de $i+1$ à i , soit pour les probabilités : $p_i \frac{2n-i}{2n} = \frac{1+i}{2n} p_{i+1} \Leftrightarrow p_{i+1} = \frac{2n-i}{1+i} p_i$.

On a donc $p_1 = \binom{2n}{1} p_0$, $p_2 = \binom{2n}{2} p_0$, ... $p_k = \binom{2n}{k} p_0$ et comme $\sum_{k=0}^{2n} p_k = 1$, on obtient

$$p_0 \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} = 1 \Leftrightarrow p_0 = \frac{1}{2^{2n}} \text{ et } p_k = \frac{1}{2^{2n}} \binom{2n}{k}$$

avec un temps moyen de retour égal à l'état k : $m_{kk} = \frac{1}{p_k}$.

Si on attend assez longtemps on peut revenir à chaque état : par exemple pour revenir à l'état 0 (toutes les molécules dans A), on a $m_{00} = 2^{2n}$, soit un temps quasi-infini... Pour revenir à l'état n (équilibre) on a

$p_n = \frac{1}{2^n} \binom{2n}{n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$ avec la formule de Stirling, soit $m_{nn} \sim \sqrt{\pi n}$: pour des grandes valeurs de n , m_{00} est

beaucoup plus grand que m_{nn} , c'est pourquoi on observe les états voisins de n et jamais le retour en 0. La variance du retour à 0 vaut $\sigma_{nn}^2 \sim (2^{2n})^2$ ce qui limite encore cette possibilité.

Par ailleurs l'approximation gaussienne de la loi binomiale montre que

$$p_n \left(\left[\frac{2n - c\sqrt{2n}}{2}, \frac{2n + c\sqrt{2n}}{2} \right] \right) \sim \mathbb{P}(-c \leq G \leq c) = 1 - 2\mathbb{P}(G > c)$$

où G est une v.a. gaussienne de densité $g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$.

Voici une estimation de cette quantité : pour $t > 0$, l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev donne

$$\mathbb{P}(G > c) = \mathbb{P}(e^{tG} > e^{tc}) \leq e^{-tc} \mathbb{E}(e^{tG}) = e^{-tc} e^{t^2/2} ;$$

pour $t = c$ on a $\mathbb{P}(G > c) \leq e^{-c^2/2}$. Pour c égale à quelques unités, la diffusion d'Ehrenfest, si elle part de n , n'a

pratiquement aucune chance de sortir de l'intervalle $\left[\frac{2n - c\sqrt{2n}}{2}, \frac{2n + c\sqrt{2n}}{2} \right]$ en un temps raisonnable.

8. Le Pagerank de Google

Google cherche à classer l'importance des pages web en fonction des requêtes des internautes : vu l'importance d'apparaître en tête de liste l'algorithme de calcul doit prendre en compte de nombreux paramètres comme les occurrences des mots cherchés, l'importance des pages dans le web (nombre de liens pointant vers elle, nombre de liens sortants, ...), etc.

Si on s'intéresse surtout aux liens on peut voir le web comme un graphe et le parcours de l'internaute comme une chaîne de Markov.

On s'intéresse à une page P_i dont on va mesurer l'importance par un paramètre μ_i : par exemple si on compte toutes les pages P_j pointant vers P_i , on peut définir $\mu_i = \sum_{j \rightarrow i} 1$, le $j \rightarrow i$ résumant le pointage de P_j vers P_i . Il est

facile de voir que ce comptage est peu pertinent et facilement manipulable... il suffira de créer de multiples pages pointant vers P_i pour le valoriser. A contrario des pages d'« annuaires » vont proposer beaucoup de liens divers avec souvent un lien réciproque alors que leur pertinence est limitée : ceci dit on peut quand même en tenir compte

en utilisant le nombre de liens émis par la page P_j , soit l_j et en prenant $\mu_i = \sum_{j \rightarrow i} \frac{1}{l_j}$: μ_i compte le nombre de votes

pour i pondéré par l'importance de P_i dans ce vote. C'est un peu mieux mais encore trop facile à manipuler et en général assez peu pertinent.

Il semble relativement clair qu'il faut prendre également en compte l'importance des pages P_j : $\mu_i = \sum_{j \rightarrow i} \frac{1}{l_j} \mu_j$ le fait

en étant un peu plus compliqué à calculer puisque récursif : il va falloir résoudre un système d'inconnues μ_j et μ_i ce qui est possible avec un ordinateur même pour de gros systèmes.

Prenons l'exemple d'un surfeur aléatoire passant d'une page à une autre au hasard : à l'instant t il est arrivé sur la page P_j avec la probabilité p_j ; à $t+1$ il est sur P_i avec la probabilité $\frac{1}{l_j} p_j$: il arrive donc sur P_i avec la probabilité

$p'_i = \sum_{j \rightarrow i} \frac{1}{l_j} p_j$. Si on part avec une distribution initiale $p_t = (p_1, p_2, \dots, p_i, \dots, p_j, \dots, p_n)$, on passe alors à

$p_{t+1} = (p'_1, p'_2, \dots, p'_i, \dots, p'_j, \dots, p'_n)$, on reconnaît une chaîne de Markov où la distribution stationnaire est

précisément donnée par les solutions de l'équation $p_i = \sum_{j \rightarrow i} \frac{1}{l_j} p_j$.

Le principal problème rencontré par cette méthode est lorsque le graphe contient des pages sans issues ($l_j = 0$) appelées *trous noirs*. Pour éviter ces derniers il suffit que le surfeur quitte la page volontairement avec une probabilité c et redémarre ailleurs sur une des n pages prise au hasard : la transition est alors donnée par

$p'_i = c \frac{1}{n} + (1-c) \sum_{j \rightarrow i} \frac{1}{l_j} p_j$. La valeur de c est déterminée par le nombre moyen de pages suivies préalablement par

le surfeur : $\frac{1}{n_p}$: par exemple $c = 0,15$ correspond à 6 pages visitées en moyenne, ce qui semble réaliste (?).

Ce choix de c garantit en tous cas que la matrice de transition est bien irréductible et apériodique, ce qui assure à Mrs Brin et Page l'existence et l'unicité d'une distribution stationnaire, soit de confortables revenus.

Remarques

1. L'hypothèse à la base du modèle est que l'on peut considérer un lien sur une page comme un vote positif, d'autant plus important que le lien est isolé et la page du lien souvent citée... Pas évident pour les webmasters...

2. The intentional surfer model

The original Pagerank algorithm reflects the so-called random surfer model, meaning that the PageRank of a particular page is derived from the theoretical probability of visiting that page when clicking on links at random. However, real users do not randomly surf the web, but follow links according to their interest and intention. A page ranking model that reflects the importance of a particular page as a function of how many actual visits it receives by real users is called the *intentional surfer model*. The Google toolbar sends information to Google for every page visited, and thereby provides a basis for computing PageRank based on the intentional surfer model. The introduction of the [nofollow](#) attribute by Google to combat [Spamdexing](#) has the side effect that webmasters commonly use it on outgoing links to increase their own PageRank. This causes a loss of actual links for the Web crawlers to follow, thereby making the original PageRank algorithm based on the random surfer model potentially

unreliable. Using information about users' browsing habits provided by the Google toolbar partly compensates for the loss of information caused by the [nofollow](#) attribute. The [SERP](#) rank of a page, which determines a page's actual placement in the search results, is based on a combination of the random surfer model (PageRank) and the intentional surfer model (browsing habits) in addition to other factors.

9. Références

Graphes : <http://www.apprendre-en-ligne.net/graphes/index.html>

Chaines de Markov, exemples divers et cours : <http://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/Markov.pdf>
<http://www.proba.jussieu.fr/cours/dea/telehtml/telehtml.html>

<http://math.unice.fr/~diener/MAB06/Markov2.pdf> (voir exemple forêt)

<http://www.sites.univ-rennes2.fr/laboratoire-statistique/AGUYADER/doc/proba/poly.pdf> (unicité loi stat, p 122)

Dartmouth College, *Introduction to probability*, AMS sd

http://www.dartmouth.edu/~chance/teaching_aids/books_articles/probability_book/book.html

(+ programmes Mathematica, Maple V, Basic)

Benaïm Michel, El Karoui Nicole, *Promenade Aléatoire*, Éd. de l'École Polytechnique, 2004

Engel Arthur, *L'enseignement des probabilités et de la statistique*, volumes 1 & 2, Cedic Nathan 1979

Engel Arthur, *Mathématique élémentaire d'un point de vue algorithmique*, Cedic Nathan sd

Foata Dominique, Fuchs Aimé, *Processus Stochastiques*, Dunod 2002

Frugier Gérard, *Exercices ordinaires de probabilités*, Ellipses 1992

Lefebvre Mario, *Processus stochastiques appliqués*, Hermann 2005

Rényi Alfred, *Calcul des probabilités*, Dunod 1966

Pagerank Google : <http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~eiser/Enseignement/google.pdf>, Bulletin vert APMEP 489, M. Eisermann 2009.

Wikipedia (eng) : <http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank>